


Revista de Vigilancia Pasiva Fitosanitaria

Volumen 13

Semana #41

del Domingo, 4 de Octubre de 2026, al Sábado, 10 de Octubre de 2026



**USDA modifica y libera algunas
áreas de la zona 15 infestada por
GBG en Texas**



**Ecuador: verifican acciones contra
Foc R4T en El Quemado**



**Primer reporte de *Candidatus
Arsenophonus phytopatogenicus*
en maíz en Alemania**

Contenido

Dependencias Gubernamentales	p. 3
USDA modifica y libera algunas áreas de la zona 15 infestada por GBG en Texas	p. 3
Ecuador: verifican acciones contra Foc R4T en El Quemado	p. 3
Artículos Científicos	p. 4
Primer reporte de Candidatus Arsenophonus phytopatogenicus en maíz en Alemania	p. 4
Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)	p. 5
Inteligencia artificial ayuda a detectar al picudo rojo que afecta a palmeras en Uruguay	p. 5

Dependencias Gubernamentales



USDA modifica y libera algunas áreas de la zona 15 infestada por GBG en Texas

Lugar: Estados Unidos
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 6 de Octubre de 2026

Expertos estatales y federales en la materia confirman que ciertas partes del condado de Pecos (Z15) cumplen con los requisitos establecidos en el Manual de respuesta del APHIS para la liberación de zonas afectadas por el gusano barrenador del ganado (GBG) y redesignan a las áreas todavía afectadas por el GBG como zona 15A.



Ecuador: verifican acciones contra Foc R4T en El Quemado

Lugar: Ecuador
Clasificación: Dependencias Gubernamentales
Nivel de importancia: Alto
Fecha: Martes, 6 de Octubre de 2026

Autoridades de Agrocalidad y de la provincia de El Oro, recorrieron la zona de El Quemado, cantón Santa Rosa, para verificar las acciones ejecutadas frente a Foc R4T. Constataron: 1) la reconfiguración del muro externo y perimetral del primer brote y el refuerzo de las barreras de protección; 2) el reencarpado de las zonas afectadas; 3) el cercado del área. Dichas medidas permiten mantener el sitio bajo control y reducir el riesgo de dispersión del hongo.

Artículos Científicos



Primer reporte de *Candidatus Arsenophonus phytopatogenicus* en maíz en Alemania

Lugar: Alemania

Clasificación: Artículos Científicos

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Sábado, 3 de Octubre de 2026

Se observaron plantas de maíz con el tejido foliar de color rojizo, granos mal formados y mazorcas con llenado defectuoso o abortadas. Las muestras recolectadas se analizaron mediante diversos análisis moleculares, que indicaron a *Candidatus Arsenophonus phytopatogenicus*.

Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)



Inteligencia artificial ayuda a detectar al picudo rojo que afecta a palmeras en Uruguay

Lugar: Uruguay

Clasificación: Notas Periodísticas (COMUNICADO NO OFICIAL)

Nivel de importancia: Alto

Fecha: Lunes, 5 de Octubre de 2026

Un proyecto de la Universidad Tecnológica de Uruguay, apoyado por el laboratorio de IA de una empresa tecnológica, desarrolló una herramienta para identificar señales de la presencia del picudo rojo mediante el análisis de imágenes de palmeras. La herramienta permite automatizar la definición de patrones observados en fotografías tomadas a los ejemplares afectados.